

LISTE DES ORTHOPTÈRES

Capturés dans le Sahara algérien par M. le professeur LAMEERE

par A. Finot.

FORFICULIDES.

Labidura riparia Pallas. — ♂ ♀, Hammam Salahin, 3 avril 98; Biskra, 18 avril 98.*Anisotabis annulipes* Lucas. — ♂, Biskra, 2 avril 98

BLATTIDES.

Heterogamia livida Brunner. — 1 ♂ et 4 larves, Dra-Alkesdir, 16 mai 98.La synonymie de *livida* Brunner est incertaine, j'ai suivi la faune d'Algérie suivant le Dr Krauss, c'est *Heterogamia ursina* Burm.*Periplaneta orientalis* Linné. — 1 ♂, Ouargla à Ghardaïa, 21-24 mai 98.*Loboptera decipiens* Germar. — Larves, Biskra, 2 avril 98.

MANTIDES.

Eremiaphila numida de Saussure. — ♂ ♀, Maouiet-Ferzan à Maouiet-al-Caïd, 7 mai 98; larves, Houdérat à Selfana, 23 mai 98, et Laghouat à Messaad, 6-7 juin 98.*Severinia* (*Heterochaeta*) *Lemoroi* Finot. — ♂, Tillis, 14 mai 98.

Le ♂ était inconnu; il diffère de la ♀ par les caractères suivants. La connaissance du ♂ a nécessité d'établir un nouveau genre.

***Severinia Lemoroi* Finot.** — Bull. Soc. ent. de France, 1893, p. XXIX, et Ann. Soc. ent. de France, 1895, p. (41) 97, fig. 10, 11 et 12, ♀.♂. *A femina differt*: Testaceo-grisea. Oculi globosi, non spinosi. Antennae filiformes, longissimae. Pronotum leve; carina longitudinali media sulco typico secta, ubique percurrente; marginibus lateralibus laevibus. Elytra leviter abbreviata, sextum segmentum abdominis attingentia; campo marginali flavo-testaceo, sub-opaco; reliquo hyalino; membrana anali hyalina. Alae elytris aequae longae, angustiores, hyalinae; parte antica flavo-testacea, subopaca; in campo radiati nonnullis maculis nigris ornatae. Pedes graciliores. Cerci laminati, longe-ovati, plani, marginibus lateralibus non sinuatis, exceptis insertionibus articulorum. Lamina subgenitalis subtriangularis, apice minime excisa, stylis parvis et parum remotis.*Longitudo corporis*: ♂, 40 mill.*Id. pronoti*: ♂, 10 mill.*Id. elytrorum*: ♂, 22 mill.*Id. antennarum*: ♂, 16 mill.*Habitat*: in desertis Sahara, Tillis, mense maio.J'avais placé, sans trop d'hésitation, cette espèce *Lemoroi* dans le genre *Heterochaeta* Westwood; mais après la connaissance du ♂ qui n'a pas les yeux prolongés en pointe, je pense qu'il serait préférable de placer cette espèce dans un genre nouveau *Severinia* intermédiaire entre les *Popae* et les *Heterochaetae*, dans la tribu des *Vatidae*.

Genus SEVERINIA Finot.

*Species africana. Corpus valde elongatum, gracile. Vertex pone oculos non productus. Occiput obtusum. Antennae ♂ simplices. Oculi globosi, in ♀ apice in spina brevi subcylindrica, obtusa, terminati. Pronotum elongatum, parte postica pone sulcum transversum sita quam pars antica triplo longiore; supra coxas leviter dilatatum; coxis anticis valde longius. Campus marginalis elytrorum irregulariter reticulatus. Pedes postici non lobati. Coxae anticae non lobatae, margine superno apice non dilatato. Femora antica subtus margine interno spinis aequalibus armata. Tibiae anticae subtus margine externo spinuloso. Tibiae nec non femora intermedia et postica supra carinata. Femora postica non lobata. Tarsorum posticorum articulus primus duobus sequentibus unitis longior. Lamina supra-analis transversa, apice rotundata. Cerci laminati.**Iris oratoria* Linné. — ♂, Dra Alkesdir à El Bud, 18 mai 98.*Blepharis mendica* Fabricius. — Larve, Biskra, 12 avril 98.

ACRIDIDES.

Paratettix meridionalis Rambur. — ♂, Biskra, 14-27 avril 98.*Truxalis nasuta* Linné, variété *algerica*. — Larves ♂, Biskra, 2-7 avril 98.*Truxalis unguiculata* Rambur. — ♂ ♀, Maouiet-Ferzan à Maouiet-al-Caïd, 7 mai 98; Maouiet-Ferzan à Tougourt, 11 mai 98; Blidet-Amar à Tillis, 14 mai 98; Laghouat à Messaad, 6-7 juin 98.*Ochridia tibialis* Fieber. — ♂, Mela, 15 mai 98.*Ochridia filicornis* Krauss. — ♂ ♀, Biskra, 25 avril 98.*Phlaeoba* (*Duronina*) *Lucasi* Bolivar. — ♂ ♀, Biskra, 11-27 avril 98; Tougourt, 12 mai 98.*Phlaeoba* (*Duronina*) *Lucasi* Bolivar, variété *Laurae* de Bormans. — ♀, Biskra, 21-27 avril 98.

- Epacromia thalassina* Fabricius. — ♂ ♀, Biskra, 2-27 avril 98.
Eremogryllus hammadei Krauss. — ♂ ♀, larves et nymphes, de Tougourt à Maouiet-al-Caïd, 7-11 mai 98; Mellala à Houderat, 23 mai 98.
Oedipoda gratiosa Serville. — ♂, Laghouat, 2 juin 98.
Acrotylus patruelis Sturm. — ♀, Biskra, 7-25 avril 98; Ghardaïa, 26 mai 98.
Helioscirtus capsitanus Bonnet. — ♂, Berrián, 28 mai 98.
Sphingonotus caeruleus Linné. — ♂, Biskra, 12 avril 98.
Sphingonotus Mecheria Krauss (variété de *caeruleus* L.). — ♂ ♀, Ouargla, 20 mai 98; Berrián, 28 mai 98.
Sphingonotus desertorum Vosseler (peut-être encore inédit, M. Vosseler préparant une faune du Sud-Oranais). — ♂, Tillis à Mela, 15 mai 98.
Sphingonotus Savignyi de Saussure. — ♂ ♀, Biskra, 15 avril 98.
Sphingonotus Lameerei spec. nova. — ♀, Ouargla à Mellala, 20 mai 98.

Sphingonotus Lameerei Finot. — Sphingonoto Satrapes de Saussure (*Prodromus Oedipodiorum*, 1884, p. 199, du Turkestan et de Perse), affinis, differt :

Foveolae verticis (tempora) marginales. Vertex leviter carinatus. Antennae articulis nonnullis alternantibus fuscis. Pronoti prozona vix carinulata; metazona leviter carinata; sulco intermedio interrupto; metazonae canthis lateralibus non carinatis. Alae sat latae, margine postico non sinuato, disco basali caeruleo, fascia nigra media areolis nonnullis nebulosis, campo antico apice nigro-maculato; lobo axillari apice nigro-maculato. Tibiae posticae caeruleae.

Longitudo corporis : ♀, 41 mill.

Id. elytrorum : ♀, 41 mill.

Cette espèce est dédiée à M. le professeur Lameere.

Habitat : in desertis Sahara, inter Ouarglam et Mellalam, mense maio.

- Sphingonotus octofasciatus* Serville. — ♂, Ouargla, 20 mai 98; Ouargla à Mellala, 21 mai 98.
Oedaleus nigrofasciatus de Geer. — ♀ nymphe et larve, région des Dayas, 1^{er} juin 98; ♂ nymphe, Laghouat, 3-4 juin 98.
Pachytylus cinerascens Fabricius. — ♂ ♀, Biskra, 25 avril 98.
Eremobia cisti Fabricius. — ♂ ♀, Hammam Salahin, 25 avril 98; El Ourir à Sidi Yaya, 3 mai 98; Ouargla à El Bud, Kouinin, 8 mai 98; 17 mai 98; Houderat à Selfana, 23 mai 98; Laghouat à Messaad, 6-7 juin 98.
Eremobia Claveli Lucas. — ♂ ♀, Hammam Salahin, 23 avril 98; Laghouat, 2 juin 98; Laghouat à Messaad, 6-7 juin 98.

- Eremocharis insignis* Lucas. — Nymphe, ♀ larve, Biskra, 6-14 avril 98.
Pyrgomorpha grylloides Latreille. — ♂ ♀, Biskra, 27 avril 98; Tougourt, 12 mai 98; Temacin, 13 mai 98; Berrián, 28 mai 98.
Pamphagus Hespericus Rambur. — ♂, Laghouat, 3-4 juin 98.
Eunapius Sufiensis Brisout (synonyme : *Brunneri* Stål). — ♂ ♀, Laghouat à Messaad, 6-7 juin 98.
Dericorys Millierei Finot. — ♂ nymphe, Biskra, 28 avril 98; région des Dayas, 1^{er} juin 98; ♀ nymphe, Laghouat, 2 juin 98.
Acridium aegyptium Linné. — ♂, Biskra, 7 avril 98.
Euprepocnemis plorans Charpentier. — ♂ ♀, Biskra, 11-25 avril 98.
Euprepocnemis littoralis Rambur. — ♂ ♀, Biskra, 11-25 avril 98; Dra-Alkesdir à El Bud, 11 mai 98; Ghardaïa, 26 mai 98; Laghouat à Messaad, 6-7 juin 98.
Opomala cylindrica Marsch. — ♂ ♀, Hammam Salahin, 3 avril 98; Biskra, 11-25 avril 98.

LOCUSTIDES.

- Ephippiger Innocentii* Bonnet et Finot. — ♂ ♀ et larves, Laghouat à Messaad, 6-7 juin 98.

GRYLLIDES.

- Gryllus Burdigalensis* Latr., var. *arvensis* Rambur (malgré le manque de tympan à la face interne du tibia antérieur). — ♂, Biskra, 25 avril 98; larve ♀, Biskra, 31 avril 98.
Gryllus Algirius de Saussure? — Larve ♂, Biskra, 3 avril 98.
Gryllus bimaculatus de Geer. — Larve ♂, Biskra, 2 avril 98.